Sobreposição de Etiologias em Paciente Jovem com Miocardite Grave: Relato de Caso

Overlapping Etiologies in a Young Patient with Severe Myocarditis: A Case Report

Thaís Martins de Oliveira,¹ Fernando Luis Scolari,² Fabiano de Oliveira Poswar,¹ Francine Hehn de Oliveira,³ Ricardo Stein,^{4,5} Lívia Adams Goldraich^{2,4}

Serviço de Genética, Hospital de Clínicas de Porto Alegre,¹ Porto Alegre, RS – Brasil

Equipe de Insuficiência Cardíaca e Transplante Cardíaco, Serviço de Cardiologia, Hospital de Clínicas de Porto Alegre,² Porto Alegre, RS – Brasil

Serviço de Patologia Cirúrgica, Hospital de Clínicas de Porto Alegre,³ Porto Alegre, RS – Brasil

Programa de Pós-Graduação em Cardiologia e Ciências Cardiovasculares, Universidade Federal do Rio Grande do Sul,⁴ Porto Alegre, RS – Brasil

Departamento de Medicina Interna da Universidade Federal do Rio Grande do Sul,⁵ Porto Alegre, RS – Brasil

Introdução

A identificação etiológica de pacientes jovens com insuficiência cardíaca (IC) sempre deve ser um objetivo médico. Nesse cenário, a miocardite infecciosa é um diagnóstico possível e, quando ocorre de fato, tem um curso benigno na maioria das vezes. No entanto, cardiopatias congênitas ou formas familiares de cardiomiopatia devem ser consideradas no diagnóstico diferencial e/ou em concomitância particularmente em apresentações mais graves de miocardite. Nestes casos, além da investigação específica para miocardite, que pode incluir avaliação clínica, exames de imagem, exames laboratoriais e biópsia endomiocárdica com pesquisa do agente viral em tecido miocárdico, o estudo genético é digno de consideração.¹ A associação de etiologias pode ter impacto na apresentação e evolução clínica, mas os dados ainda são escassos,² o que faz com que ainda haja na literatura uma lacuna a ser explorada. No presente relato, descrevemos o caso de um homem jovem com quadro de choque cardiogênico secundário a miocardite viral por Epstein Barr (EBV) que cursa com a identificação de uma mutação patogênica no gene PKP2.

Relato de Caso

Paciente de 17 anos, sexo masculino, sem comorbidades prévias, procura a emergência com relato de dispneia e dor retroesternal durante exercício, evoluindo rapidamente para síncope e choque cardiogênico. Necessitou vasopressores, inotrópicos e suporte ventilatório mecânico invasivo. Eletrocardiograma apresentava elevação de segmento ST nas derivações V1, V2, aVR, e infradesnível de ST nas demais

derivações, não característicos de síndrome coronariana aguda. Ecocardiograma evidenciou aumento do volume atrial esquerdo (41 mL/m²), dilatação do ventrículo esquerdo (VE) (59/51 mm) e disfunção sistólica com fração de ejeção de 26%. Trombo intracavitário apical foi identificado e tratado com anticoagulação. Devido à suspeita clínica de inflamação miocárdica, ressonância magnética cardíaca (RMC) foi realizada e identificou sinais típicos de miocardite aguda com edema, hiperemia e realce tardio, este de aspecto não-isquêmico acometendo 45% do VE (Figura 1A). Foi iniciada antibioticoterapia por quadro de febre e leucocitose, mas o esquema foi suspenso em 5 dias por hemoculturas negativas. Avaliação sorológica identificou infecção recente por EBV, corroborando para a hipótese diagnóstica de miocardite viral. Houve melhora clínica possibilitando redução de suporte. O paciente apresentou marcada elevação de troponina I ultrasensível, a qual persistiu elevada por período prolongado: 9.411 ng/L admissão; 14.760 ng/L pico; e 31,51 ng/L após 30 dias.

O paciente apresentou melhora parcial da função ventricular em 3 meses após a alta hospitalar (fração de ejeção 42% com dilatação do VE). Nova RMC realizada após 6 meses demonstrou regressão de atividade inflamatória, mas persistência do realce tardio (Figura 1B). Apesar da terapia farmacológica otimizada com sacubitril-valsartan, metoprolol e espirolactona, e da boa capacidade funcional avaliada diretamente através da ergoespirometria (VO₂pico 34,4 mL-1.kg-1.min), após um ano de seguimento houve persistência de troponina elevada, dilatação ventricular esquerda e disfunção sistólica moderada. Optou-se por implante de cardiodesfibrilador após novo episódio de síncope na recuperação de exercício para o qual havia sido liberado. Biópsia endomiocárdica com pesquisa viral 24 meses após a apresentação e a histopatologia identificou edema tecidual discreto, áreas de hipertrofia nuclear, ausência de infiltrado linfocitário na hematoxilina-eosina, mas com ativação linfocitária na imunohistoquímica (Figura 1C). Identificou-se presença de EBV no tecido miocárdico através de PCR qualitativo, mas não através de hibridização in situ (EBER). A pesquisa para demais agentes virais (enterovírus, herpes tipo 6, parvovírus B19, herpes simples 1 e 2, adenovírus e citomegalovírus) foi negativa.

Como a doença cursou de forma muito prolongada e com intensa fibrose, se optou pela realização de estudo genético complementar (painel de 168 genes para cardiomiopatias).

Palavras-chave

Inflamação; Contusões Miocárdicas; Genética; Anormalidades Cardiovasculares.

Correspondência: Lívia Adams Goldraich •

Hospital de Clínicas de Porto Alegre - Rua Ramiro Barcelos, 2350, sala 2060.

CEP 90035-903, Porto Alegre, RS - Brasil

E-mail: lgoldraich@hcpa.edu.br

Artigo recebido em 03/02/2022, revisado em 14/02/2022, aceito em 01/03/2022

DOI: <https://doi.org/10.36660/abchf.20220022>

Figura 1 – A) Primeira RMC realizada. A.1) T2 com saturação de gordura demonstrando edema difuso no miocárdio. A.2) Realce tardio no eixo curto demonstrando impregnação subendocárdica e mesocárdica difusa, sem território coronariano definido. A.3) Realce tardio no plano 3 câmeras demonstrando impregnação subendocárdica e mesocárdica difusa, sem território coronariano definido, inclusive com acometimento dos músculos papilares. A.4) Realce tardio no plano 2 câmeras demonstrando impregnação subendocárdica e mesocárdica difusa, sem território coronariano definido. B) RMC 6 meses após a RMC da Figura 1A. B.1) T2 com saturação de gordura com ausência de edema. B.2) Realce tardio no eixo curto demonstrando dilatação ventricular e redução da impregnação, com finas áreas mesocárdicas e subendocárdicas difusas de acometimento. B.3) Realce tardio no plano 3 câmeras demonstrando dilatação ventricular e redução da impregnação, com finas áreas mesocárdicas e subendocárdicas difusas de acometimento. B.4) Realce tardio no plano 2 câmeras demonstrando dilatação ventricular e redução da impregnação, com finas áreas mesocárdicas e subendocárdicas difusas de acometimento. C) Imunohistoquímica evidenciando ativação linfocitária (CD4 positiva).

A análise molecular do caso índice (probando) identificou uma variante patogênica, c.1440_1444del, (p.Asn480Lysfs*20), no gene PKP2, NM_004572.3 (Invitae Arrhythmia and Cardiomyopathy Comprehensive Panel - Invitae Corp, San Francisco, CA, EUA). Essa variante apresenta deleção de 3 aminoácidos e tal deleção promove o surgimento de um códon de parada prematuro, gerando uma proteína truncada. Assim, esse DNA mensageiro sofre um processo chamado decaimento e não é transcrito, levando à falta dessa proteína. Ao se realizar o heredograma dessa família pôde-se observar que diversos familiares estavam sob risco de terem herdado a mutação em questão (Figura 2).

Discussão

Relatamos o caso de um paciente jovem com apresentação em choque cardiogênico por quadro de miocardite viral aguda por EBV. A pesquisa de agente viral no tecido demonstrou persistência deste agente etiológico após 24 meses da apresentação. Devido à gravidade do quadro clínico e apresentação do realce tardio na RMC, foi realizado painel genético de 168 genes para cardiomiopatias e se identificou cardiomiopatia arritmogênica (CMA) subjacente por mutação patogênica no gene PKP2.

A miocardite é uma doença inflamatória do músculo cardíaco desencadeada devido a agentes infecciosos, substâncias tóxicas e/ou ativação imune.³ A apresentação e a evolução clínica são variadas, desde resolução espontânea, até progressão para IC grave.⁴ Miocardite causada por EBV, no entanto, é rara.⁵ Relatos prévios descreveram sintomas virais (febre, prostração e mialgia) associado

a manifestações cardíacas como dispneia, dor torácica, alterações eletrocardiográficas e arritmias ventriculares.⁶ A magnitude de realce tardio no VE, no entanto, revelou-se menor em outras séries (4% a 10% da massa do VE) do que em nosso paciente (45%).⁶ É nossa hipótese que a identificação de uma mutação desmossômica patogênica possa ter sido determinante para os achados neste caso (em especial a extensão do realce tardio). É importante salientar que dúvidas ainda persistem sobre o benefício do tratamento com drogas antivirais e de terapia imunossupressora naqueles nos quais persistem sinais inflamatórios miocárdicos a despeito da eliminação viral.⁶

Por sua vez, a CMA é uma doença hereditária caracterizada pela lipo-substituição do miocárdio e fibrose intersticial. Ela se expressa através de arritmias ventriculares, podendo evoluir com dilatação ventricular e IC. Tal patologia aumenta o risco de morte súbita, podendo ser esta a primeira manifestação clínica. No entanto, apresenta penetrância incompleta e apresentação clínica variável.⁷ A maioria das mutações são descritas em genes desmossomais, dos quais o PKP2 é o mais frequente.⁸ A perda da expressão da proteína PKP2 interrompe o tráfego no canal de sódio no disco intercalado, facilitando o surgimento de arritmias.⁹

Embora previamente assintomático, a presença de alterações estruturais do VE pode ter predisposto o tropismo do EBV pelo miocárdio.² De fato, foi descrita uma maior prevalência de vírus cardiotrópicos em pacientes com CMA. Além disso, a ocorrência de infecções virais pode ter papel na progressão da doença, contribuindo para a morbimortalidade.¹⁰ Por fim, a inflamação desempenha um papel central na fisiopatologia da CMA, sendo a presença de

Relato de Caso

Figura 2 – Hereditograma. Note que os pacientes III.2, III.3, III.4, III.5, III.6 e III.7 apresentaram risco de 50% de terem herdado variante patogênica caso a paciente II.3 seja heterozigota.

infiltrados linfocíticos um achado comum, mesmo quando não há identificação de genoma viral. Em alguns casos, a fase ativa desta enfermidade pode apresentar-se como uma miocardite clínica, o que reforça a muito provável sobreposição entre essas duas condições.¹¹

Conclusão

Apresentamos o caso de um paciente jovem admitido por choque cardiogênico devido a quadro de miocardite por EBV, sendo o mesmo portador de mutação patogênica no gene PKP2, o mais frequentemente envolvido com quadros de CMA familiar. Apresentações graves de miocardite por agentes infecciosos podem cursar em paralelo a diferentes cardiomiopatias hereditárias e, nestes pacientes, estudo em cascata e aconselhamento genético familiar podem auxiliar no manejo terapêutico sob a ótica de melhores evidências disponíveis aliadas ao novo conceito de medicina personalizada.

Contribuição dos autores

Concepção e desenho da pesquisa: Oliveira TM, Goldraich LA; Obtenção de dados: Oliveira TM, Oliveira FH; Análise

e interpretação dos dados: Oliveira TM, Scolari FL, Poswar FO, Oliveira FH, Stein R; Redação do manuscrito: Oliveira TM, Scolari FL, Poswar FO, Goldraich LA; Revisão crítica do manuscrito quanto ao conteúdo intelectual importante: Scolari FL, Poswar FO, Stein R, Goldraich LA.

Potencial conflito de interesse

Não há conflito com o presente artigo

Fontes de financiamento

O presente estudo não teve fontes de financiamento externas.

Vinculação acadêmica

Não há vinculação deste estudo a programas de pós-graduação.

Aprovação ética e consentimento informado

Este artigo não contém estudos com humanos ou animais realizados por nenhum dos autores.

Referências

1. Wong CM, Hawkins NM, Petrie MC, Jhund PS, Gardner RS, Ariti CA, et al. Heart Failure in Younger Patients: The Meta-Analysis Global Group in Chronic Heart Failure (MAGGIC). *Eur Heart J*. 2014;35(39):2714-21. doi: 10.1093/eurheartj/ehu216. Epub 2014 Jun 17. PMID: 24944329.
2. Campuzano O, Fernández-Falgueras A, Sarquella-Brugada G, Sanchez O, Cesar S, Mademont I, et al. A Genetically Vulnerable Myocardium May Predispose to Myocarditis. *J Am Coll Cardiol*. 2015;66(25):2913-14. doi: 10.1016/j.jacc.2015.10.049.

3. Pollack A, Kontorovich AR, Fuster V, Dec GW. Viral Myocarditis--Diagnosis, Treatment Options, and Current Controversies. *Nat Rev Cardiol.* 2015;12(11):670-80. doi: 10.1038/nrcardio.2015.108.
4. Ammirati E, Frigerio M, Adler ED, Basso C, Birnie DH, Brambatti M, et al. Management of Acute Myocarditis and Chronic Inflammatory Cardiomyopathy: An Expert Consensus Document. *Circ Heart Fail.* 2020;13(11):e007405. doi: 10.1161/CIRCHEARTFAILURE.120.007405.
5. Roubille F, Gahide G, Moore-Morris T, Granier M, Davy JM, Vernhet H, et al. Epstein Barr Virus (EBV) and Acute Myopericarditis in an Immunocompetent Patient: First Demonstrated Case and Discussion. *Intern Med.* 2008;47(7):627-9. doi: 10.2169/internalmedicine.47.0691.
6. Mavrogeni S, Spargias K, Bratis C, Kolovou G, Papadopoulou E, Pavlides G. EBV INFECTION as a Cause of VT: Evaluation by CMR. *JACC Cardiovasc Imaging.* 2011;4(5):561-2. doi: 10.1016/j.jcmg.2010.11.022.
7. Svensson A, Platonov PC, Haugaa KH, Zareba W, Jensen HK, Bundgaard H, et al. Genetic Variant Score and Arrhythmogenic Right Ventricular Cardiomyopathy Phenotype in Plakophilin-2 Mutation Carriers. *Cardiology.* 2021;146(6):763-71. doi: 10.1159/000519231.
8. van Opbergen CJM, Noorman M, Pfenninger A, Copier JS, Vermij SH, Li Z, van der Nagel R, et al. Plakophilin-2 Haploinsufficiency Causes Calcium Handling Deficits and Modulates the Cardiac Response Towards Stress. *Int J Mol Sci.* 2019;20(17):4076. doi: 10.3390/ijms20174076.
9. Novelli V, Malkani K, Cerrone M. Pleiotropic Phenotypes Associated With PKP2 Variants. *Front Cardiovasc Med.* 2018;5:184. doi: 10.3389/fcvm.2018.00184.
10. Fontaine G, Fontaliran F, Andrade FR, Velasquez E, Tonet J, Jouven X, et al. The Arrhythmogenic Right Ventricle. Dysplasia versus Cardiomyopathy. *Heart Vessels.* 1995;10(5):227-35. doi: 10.1007/BF01744901.
11. Lopez-Ayala JM, Pastor-Quirante F, Gonzalez-Carrillo J, Lopez-Cuenca D, Sanchez-Munoz JJ, Oliva-Sandoval MJ, et al. Genetics of Myocarditis in Arrhythmogenic Right Ventricular Dysplasia. *Heart Rhythm.* 2015;12(4):766-73. doi: 10.1016/j.hrthm.2015.01.001.